



## **10 - ANQUILOGLOSSIA E ALEITAMENTO MATERNO: REVISÃO DE LITERATURA**

### **Autores:**

#### **Luana Maria de Moura Santos**

Graduanda em Odontologia pelo Centro Universitário FACOL- UNIFACOL, Brasil.

#### **Patrícia Sthefânia Mulatinho Paiva**

Graduanda em Odontologia pelo Centro Universitário FACOL- UNIFACOL, Brasil.

#### **Kleyciane Kévilin Pereira da Silva**

Graduanda em Odontologia pelo Centro Universitário FACOL- UNIFACOL, Brasil.

#### **Lohana Maylane Aquino Correira de Lima**

Mestranda em Clínica integral pela Universidade Federal de Pernambuco- UFPE, Brasil.

#### **Marcela Côrte Real Fernandes**

Mestranda em Clínica integral pela Universidade Federal de Pernambuco- UFPE, Brasil.

#### **Ricardo Eugenio Varela Ayres de Melo**

Coordenador do curso de Especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial pela Universidade Federal de Pernambuco- UFPE, Brasil.

**Categoria:** Revisão de Literatura.

[luanasantos.99412@gmail.com](mailto:luanasantos.99412@gmail.com)

**Palavras-chave:** Anquiloglossia; Aleitamento Materno; Frenotomia.

A anquiloglossia é uma anomalia congênita caracterizada por um frênulo lingual curto ou com inserção próxima ao ápice da língua limitando os movimentos de protusão e elevação da língua. Alguns estudos demonstram a influência da anquiloglossia sobre a



amamentação, as restrições nos movimentos da língua podem prejudicar as funções de sucção e deglutição dos bebês. O objetivo desse trabalho foi analisar na literatura a influência do freio lingual em relação a amamentação. Em 2014 foi aprovada a lei federal nº 13.002 que obriga a aplicação de protocolo para avaliação do frênulo lingual em recém-nascidos e bebês de todas as maternidades do Brasil, visando à prevenção de intercorrências que dificultem o aleitamento natural em decorrência de deficiências das funções de sucção e deglutição, que se associa ao baixo ganho de peso. O aleitamento materno é considerado umas das principais práticas de promoção a saúde e alguns fatores relacionados ao desmame precoce pode estar associado a pega incorreta do peito e a anquiloglossia. Para um correto diagnóstico da anquiloglossia é necessário a utilização de protocolos clínicos, após diagnóstico de interferência da língua é recomendado a frenotomia, a maioria dos estudos apontam os benefícios da frenotomia sobre a amamentação. A frenotomia é um procedimento cirúrgico simples que deve ser realizado nos primeiros meses de vida. Conclui-se que o frênulo lingual tem grande associação a qualidade da amamentação, sendo de grande importância o diagnóstico precoce para se evitar o desmame precoce.