



61 - ADENOMA PLEOMÓRFICO EM JOVEM: RELATO DE CASO

Autores:

Gabriella Gomes Moraes

Aluno de Graduação em Odontologia no Instituto de Saúde de Nova Friburgo - Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo – RJ, Brasil.

Andressa Martins Corrêa

Aluno de Graduação em Odontologia no Instituto de Saúde de Nova Friburgo - Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo – RJ, Brasil.

Jessica Mota Medeiros

Aluno de Graduação em Odontologia no Instituto de Saúde de Nova Friburgo - Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo – RJ, Brasil.

Maria Carolina de Lima Jacy Monteiro Barki

Professor do Departamento de Formação Específica do Curso de Odontologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo - Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo – RJ, Brasil.

Categoria: Relato de Caso.

gabriellamoraes@id.uff.br

Palavras- chave: Adenoma Pleomórfico; Neoplasia Benigna; Patologia.

O adenoma pleomórfico é uma neoplasia benigna que acomete as glândulas salivares menores e pode ser caracterizado clinicamente como uma lesão nodular de crescimento lento e assintomático. Sua etiopatogenia é incerta e histopatologicamente pode apresentar camada ductal dupla, matriz condroide e presença de célula mioepitelial. Sua principal localização é na região de palato, sendo predominante no sexo feminino. O objetivo é relatar o caso clínico de um adenoma pleomórfico localizado em região posterior esquerda do palato duro em paciente jovem. Paciente 21 anos de idade, sexo feminino foi encaminhada pelo endodontista para o estomatologista para avaliação de lesão localizada no palato. Ao exame físico, foi possível observar um único nódulo, coloração rósea, consistência borrachóide à palpação, base séssil, medindo aproximadamente 3cm em seu maior diâmetro, indolor, que foi percebida há aproximadamente 1 ano. A partir do exame tomográfico, percebe-se uma imagem bem delimitada sugestiva de lesão de tecido mole. Foi realizada a biópsia incisional com



diagnóstico de adenoma pleomórfico. Como forma de tratamento, foi proposto e realizada a excisão cirúrgica da lesão. A paciente se encontra sem sinais de recidiva há 1 ano. O adenoma pleomórfico é a segunda neoplasia benigna de glândulas salivares mais comum, sendo a excisão cirúrgica o melhor tratamento na maioria dos casos, tendo um excelente prognóstico, com baixas taxas de recidiva e rara transformação maligna.