



193 - RELATO DE CASO: SOLUÇÃO TEMPORÁRIA DE URGÊNCIA EM CASO DE INCISIVOS CENTRAIS SUPERIORES AVULSIONADOS

Autoras:

Ester Carvalho Gomes

Aluna de Graduação em Odontologia da Faculdade de Odontologia -Universidade Federal Fluminense – Niterói, RJ

Beatriz Rangel de Brito

Aluna de Graduação em Odontologia da Faculdade de Odontologia -Universidade Federal Fluminense – Niterói, RJ

Natália de Freitas Gens

Aluna de Especialização em Ortodontia da Faculdade de Odontologia – Universidade Federal Fluminense – Niterói, RJ

Iris Trindade de Paiva Ghiu

Aluna de Mestrado em Ortodontia e Odontopediatria da Faculdade de Odontologia – Universidade Federal Fluminense – Niterói, RJ

Juliana Lucas Monteiro

Aluna de Doutorado em Ortodontia da Faculdade de Odontologia – Universidade Federal Fluminense – Niterói, RJ

Adriana de Alcantara Cury-Saramago

Professor do Departamento de Odontoclínica do Curso de Odontologia da Faculdade de Odontologia – Universidade Federal Fluminense – Niterói, RJ

Categoria: Relato de Caso

estercarvalho@id.uff.br

Palavras-chave: Ortodontia; Traumatismo dentário; Avulsão dentária; Dentição permanente; Mantenedor de espaço em ortodontia

A avulsão dentária é o deslocamento total do dente de seu alvéolo, comprometendo estruturas de suporte e o feixe vaso-nervoso. Quando possível, a conduta mais conservadora, estética e funcional é a do reimplante dentário imediato. O objetivo com este relato é apresentar o tratamento inicial do paciente G.S.F.C., do sexo masculino, com 13 anos, branco, portador de Síndrome de Van Gierke, o qual sofreu avulsão dos dentes 11 e 21 após queda da própria altura. Recebeu atendimento em ambiente hospitalar após 2 horas do trauma, quando não houve



tentativa de reimplante dos dentes. Procurou atendimento, após 1 mês do traumatismo dentário, na disciplina de Implantodontia da Universidade Federal Fluminense, quando foi orientado para receber tratamento ortodôntico na mesma instituição. Na disciplina de Ortodontia foi examinado e preencheu anamnese. Na mesma consulta foi confeccionado e instalado um aparelho ortodôntico removível em resina acrílica autopolimerizável, com os próprios dentes avulsionados após removidas as raízes dentárias e realizados desgastes das bordas incisais fraturadas consequentes do traumatismo, enquanto aguardaria a documentação ortodôntica completa para o planejamento do tratamento total. Com este procedimento preliminar restabeleceu-se adequadamente as funções de mastigação e fonação, sobretudo, possibilidade de retorno às atividades normais com o resultado estético do tratamento. Optou-se posteriormente pela substituição dos dentes 12 e 22 no local do 11 e 21, considerando a idade inicial e preservação de osso alveolar. Atualmente está em tratamento ortodôntico fixo, na fase de fechamento dos espaços com a movimentação dos dentes 12 e 22 no sentido mesial.