



22 - EMINECTOMIA UNILATERAL DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR ATRAVÉS DO ACESSO PRÉ-AURICULAR DO TIPO ROWE – RELATO DE CASO

Laryssa dos Santos Pinheiro, CD

Pós-graduanda de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial – UNIFESO

Shimelly Monteiro de Castro Lara, CD

Pós-graduanda de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial – UNIFESO

Ellena Barros Gomes, CD

Pós-graduanda de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial – UNIFESO

Ana Carolina Klein dos Santos, CD

Pós-graduanda de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial – UNIFESO

Raissa Dias Fares, CD

Pós-graduanda de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial – UNIFESO

Jonathan Ribeiro da Silva, CD, MSc, PhD

Coordenador do Curso de pós-graduação de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial – UNIFESO

E-mail para correspondência: Laryssapinheiro@id.uff.br

CATEGORIA: PROFISSIONAL

MODALIDADE: RELATO DE CASO

ÁREA: CIRURGIA

O objetivo deste trabalho consiste em relatar um caso clínico realizado no Hospital das Clínicas de Teresópolis Constantino Ottaviano (HCTCO), no qual o paciente A.P.C, sexo masculino, 32 anos, apresentava sinais clínicos de luxação recidivante de Articulação Temporomandibular (ATM) unilateral, lado direito, sendo proposto tratamento cirúrgico de Eminectomia através do acesso de pré-auricular com extensão do tipo Rowe. Após a realização do procedimento, o paciente apresentou melhora significativa de deslocamento do côndilo mandibular para fora da cavidade glenóide durante movimentos de excursão da mandíbula no transoperatório. Em um acompanhamento de 03 meses, o mesmo se mostrou realizado com o tratamento cirúrgico proposto, pois não apresenta episódios de luxação da ATM e a cicatriz do acesso realizado é menos visível. Podemos concluir que a Eminectomia é um tratamento cirúrgico satisfatório para luxação da articulação temporomandibular (ATM), definida como o deslocamento do côndilo mandibular para fora da cavidade glenóide sendo impossibilitado retorno, na qual o paciente acometido por esta desordem possui como sinais e sintomas: dificuldade de fechamento bucal, depressão pré-auricular, sialorréia, tensão dos músculos mastigatórios e dor severa na região articular.

Palavras-chave: Articulação Temporomandibular; Luxações; Mandíbula.