



29 - LIPOMA SUBMANDIBULAR: RELATO DE CASO

Júlia Moraes Moreira

Pós-graduanda de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial – Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) – Teresópolis

Raíssa Dias Fares

Pós-graduanda de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial – Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) – Teresópolis

Jonathan Ribeiro da Silva

Coordenador do Curso de pós-graduação em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial – Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) – Teresópolis

Sylvio Luiz Costa De-Moraes

Cirurgião Buco-Maxilo-Facial e Médico Cirurgião Geral

Professor do Curso de pós-graduação em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial – Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) – Teresópolis

Professor dos Cursos de graduação em Medicina e Odontologia – Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) – Teresópolis

Trustee AO Crânio-Maxilo-Facial (AOCMF)

E-mail para correspondência: juliamoraismoreira06@gmail.com

CATEGORIA: PROFISSIONAL

MODALIDADE: RELATO DE CASO

ÁREA: OUTRAS ESPECIALIDADES

O presente trabalho tem por objetivo realizar um relato de caso de um lipoma submandibular, tratado por excisão cirúrgica por meio de acesso extraoral, realizado no Hospital Das clínicas de Teresopolis Costantino Ottaviano, pela equipe de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-facial.

Paciente A.J.J.P, gênero masculino, 49 anos, procurou atendimento ambulatorial, tendo como queixa principal o aumento de volume na região submandibular há aproximadamente 10 (dez) anos. Assintomático, com ausência de comunicação com a cavidade oral. Ao exame físico aumento de volume extenso (81x33x58mm), amolecida, móvel e sem aderência ao plano profundo. Após avaliação dos exames de imagem (USG) foi possível observar uma imagem nodular isoecoica, sugestiva de lipoma, pôde ser citado como hipóteses de um diagnóstico diferencial o cisto dermoide e lesões de glândulas salivares. Com base nos dados obtidos juntamente ao exame clínico, foi proposto pela equipe cirúrgica a realização da biópsia excisional da lesão. Após a remoção total do tumor de aproximadamente 7cm, no trans-operatório, foi instalado um dreno à vácuo e manteve-se com curativo compressivo na região. Realizado o exame histopatológico, confirmou-se a hipótese do diagnóstico inicial (Lipoma). Paciente retornou ao ambulatório para acompanhamento após 1(um) mês e meio, apresentando uma resposta satisfatória ao tratamento sem evidências de recidiva.

Palavras-chave: Lipoma, submandibular, biópsia.