



## 44 - EXCISÃO CIRÚRGICA DE ODONTOMA COMPLEXO E COMPOSTO ASSOCIADO A TERCEIRO MOLAR INCLUSO

**Izabella Lopes dos Santos**

Acadêmica em Odontologia pelo Centro Universitário São José

**Thiago Hungria de Souza Calado**

Cirurgião-Dentista graduado pelo Centro Universitário São José

**Laryssa dos Santos Pinheiro**

Aluna de Pós-graduação da Especialização de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Centro Universitário Serra dos Órgãos

**Gabriela Cristina Martins de Lima**

Acadêmica em Odontologia pelo Centro Universitário São José

**Isabella Pastana Siqueira Torres**

Acadêmica em Odontologia pelo Centro Universitário São José

**Jonathan Ribeiro da Silva**

Coordenador da Especialização em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Centro Universitário Serra dos Órgãos

E-mail para correspondência: [izabella.santos.lopes@gmail.com](mailto:izabella.santos.lopes@gmail.com)

**Categoria:** Acadêmico

**Modalidade:** Relato de caso

**Área:** Cirurgia oral

O seguinte trabalho tem por objetivo descrever um caso clínico de Odontoma complexo e composto. Paciente do gênero masculino, 16 anos, compareceu ao serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Estadual Alberto Torres relatando como queixa principal “rosto inchado”. Nega histórico patológico pregresso. Ao exame físico foi constatado aumento de volume na região de corpo mandibular à esquerda, com aspecto firme à palpação, não destacável e sem mobilidade à esquerda. Ao exame tomográfico foi constatado: coleção de estruturas semelhantes a dentes de variados tamanhos e massa amorfa de esmalte e dentina que não há semelhança anatômica com um dente. O procedimento cirúrgico foi realizado em ambiente hospitalar, sob anestesia geral e intubação nasotraqueal. Optou-se por realizar acesso de Risdon (submandibular) do lado esquerdo para realização de osteossíntese na região de ângulo mandibular do lado esquerdo com material de fixação do sistema 2.4. Acesso intraoral para extração do elemento 38, que se apresentava incluso e remoção de toda estrutura mineralizada e massa amorfa. A síntese foi realizada com sutura dos acessos por planos. O tratamento com excisão local simples mostrou um resultado satisfatório e devolvendo o paciente às suas práticas convencionais e desenvolvendo assim, seu bem-estar.

**Palavras-chave:** Odontoma; Terceiro Molar; Mandíbula; Cirurgia Mandibular; Técnicas de Fixação da Mandíbula.